



PREVENCIÓN DE COVID-19 EN PROCEDIMIENTOS DE TECNOLOGÍA MÉDICA EN OFTALMOLOGÍA

VÍAS DE CONTAGIO



VÍAS RESPIRATORIAS



VÍAS CONJUNTIVAS

EL VIRUS PUEDE PROPAGARSE A TRAVÉS DE GOTITAS O AEROSOLES PRODUCIDAS AL HABLAR, TOSER, BOSTEZAR O ESTORNUDAR, SI ESTAS GOTAS O AEROSOLES, TIENEN CONTACTO CON OJOS, NARIZ O BOCA, HAY RIESGO DE CONTAGIO.

PRINCIPIOS GENERALES PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS



LAVADO DE MANOS CON AGUA Y JABÓN, DURANTE AL MENOS 20 SEGUNDOS, GENERANDO ABUNDANTE ESPUMA, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LA MANO COMPLETA, MUÑECAS Y UÑAS.

SE PUEDE UTILIZAR UN **DESINFECTANTE DE MANOS A BASE DE ALCOHOL, AL 60% MÍNIMO**. NO DEBE REALIZARSE EN MANOS CON SUCIEDAD VISIBLE.

EVITA TOCARTE OJOS, NARIZ Y BOCA CON **LAS MANOS SUCIAS** O CON GUANTES UTILIZADOS EN UN PROCEDIMIENTO.



EVITAR EL CONTACTO FÍSICO, LA DISTANCIA SOCIAL SUGERIDA ES 1,80 METROS COMO MÍNIMO.



SI PRESENTAS SÍNTOMAS, LUEGO DE INFORMAR AL EMPLEADOR, NO ASISTIR AL TRABAJO Y **QUÉDARSE EN CASA**.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CONSIDERANDO LAS VÍAS DE CONTAGIO Y LA DISTANCIA FÍSICA, SE UTILIZAN LOS SIGUIENTES EPPS.




CUBRECALZADO



MASCARILLA QUIRÚRGICA



GUANTES DESECHABLES



RESPIRADOR N95



GORRO DESECHABLE



ESCUDO FACIAL



DELANTAL DE TELA Y/O TRAJE MÉDICO



ANTIPARRAS



DELANTAL DESECHABLE

MICA O PLACA ADOSABLE AL FORÓPTERO, LÁMPARA DE HENDIDURA, ETC: separa el rostro del paciente y del profesional, evitando el intercambio de gotitas o eerosoles contaminados.